

ORIENTAÇÃO PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA

A biópsia trans-retal de próstata guiada por ultra-som, é um procedimento de fácil execução, entretanto exige por parte do paciente o cumprimento de algumas normas que descrevemos abaixo:

1- A biópsia de próstata é um procedimento que sangra, os pacientes não devem estar tomando drogas que inibam a coagulação. Se o Sr. toma medicamentos como clopidogrel, toclopitina, aspirina /AAS ou varfarina, (Marevan, Varfine, Calemadin) alerte seu médico deste fato, para suspender estas drogas sete dias antes do exame.

2- Recomendado o uso de 500mg (1 comprimido) via oral de ciprofoxaxino, 12 horas antes do procedimento e (2 comprimido de 500 mg(1 grama) 2 horas antes da biópsia.

Dose no pós exame

500mg (1 comprimido

VO após a biópsia)

Duração do antibiótico profilaxia em 24 horas (total 04 comprimidos)

3- Jejum de 08 oras para alimentos e jejum de 04 horas para líquidos, isto significa queo Sr. não pode comer 08 horas antes do exame e não pode tomar líquidos 04 horas antes do exame.

4- Lavagem intestinal com um frasco de Phospo enema – adquirir um frasco , via retal (para ser realizada no dia do procedimento em casa, 01 horas antes de sair de casa.

* Sedação – o Sr. será submetido a anestesia local ou sedação para reduzir o desconforto durate o procedimento.

5 - Se for fumante e/ou faz uso de bebida alcoólica, e é necessário ficar 24 horas antes do exame sem fazer uso destas substâncias.

6- Trazer anotado todos os medicamentos em uso.

7- É obrigatório trazer acompanhante (maior de 18 anos), pois, sem o mesmo o paciente não poderá realizar o exame.

8- Após a biópsia o paciente pode ir para casa. Sugere-se evitar atividades físicas, incluindo atividade sexual até o dia seguinte. Como alguns médicos optam por uma sedação leve antes da biópsia, não é indicado dirigir após o procedimento.

9- Repousar por no mínimo 04 horas após o exame.

Após o exame:

- Geralmente ocorre: Ardência ao urinar, surgimento de sangue nas fezes, urina e esperma, sendo geralmente limitados.

- Em caso de urina presa, febre, calafrios, sangramento acentuado e mal estar intenso, entre e, contato com o serviço de urologia do Hospital Alberto Rassi/ HGG.

- Retenção de urina, urina presa. Se após a biópsia o paciente tiver vontade de urinar, mas não conseguir, deve-se contatar o urologista.

- É normal haver um pouco de dor na região pélvica e uma pequena perda de sangue pelo ânus. Também são comuns a presença de pequena quantidade de sangue na urina e no esperma por alguns dias, Outro achado, não preocupante é uma mudança de cor do esperma por algumas semanas, ficando este geralmente mais claro.

- Se o sangramento urinário ou retal for de grande quantidade ou persistir por mais de três dias.

- Uma dor que se agrava em vez de melhorar com o passar dos dias ou presença de febre também são sinais de possíveis complicações.

10 Observações:

- Comparecer 01 hora antes do horário marcado.

- Só será remarcado o exame, se apresentar atestado médico.

- No dia da realização do exame retirar a senha – exame de imagem

Identificação do Formulário	Armazenamento/ Preservação	Acesso	Recuperação	Retenção	Descarte
Cód. REQ 301 Versão: 001 - Pág. 1 de 1	Arquivo específico da área/ cópia digital	Pasta específica/ colaboradores da área	Por nome e data	Permanente	Não se aplica